



CLENPIQ™
(sodium picosulfate, magnesium oxide,
and anhydrous citric acid) Oral Solution
10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

CÓMO TOMAR CLENPIQ

PASOS PARA COMPLETAR LA PREPARACIÓN

Régimen de dosis dividida

La noche anterior

Entre las 5 PM y las 9 PM



Tome 40 oz (5 tazas) de líquidos transparentes.*
Deje de ingerir líquidos durante las 5 horas siguientes.

Esa mañana

5 horas antes del procedimiento



Tome al menos 24 oz (3 tazas) de líquidos transparentes.
Deje de ingerir líquidos 2 horas antes de su colonoscopia o según lo que le indique su médico.



La hidratación es importante y es parte de la preparación. Asegúrese de hidratarse antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ y después de terminar CLENPIQ.

Asistencia para la preparación Use la asistencia para la preparación como guía para completar su preparación.

La hora de su colonoscopia es _____:_____

Complete su preparación y finalice la hidratación antes de _____:_____

EL DÍA ANTES DE LA COLONOSCOPIA, deje de consumir alimentos sólidos y lácteos, y comience a hidratarse con líquidos transparentes.



La noche antes de la colonoscopia

Tome un frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco.

Luego, continúe hidratándose
Tome 5 tazas (de 8 onzas cada una) de líquidos transparentes.
Marque las tazas a continuación a medida que las tome.



Comience: _____:_____

Finalice: _____:_____

La mañana de la colonoscopia

Tome el otro frasco de CLENPIQ
Tome CLENPIQ directamente del frasco.

Luego, continúe hidratándose
Tome al menos 3 tazas (de 8 onzas cada una) de líquidos transparentes.
Marque las tazas a continuación a medida que las tome.



O MÁS

Comience: _____:_____

Finalice: _____:_____

*Si después de la primera dosis, tiene hinchazón, inflamación o dolor intenso en el estómago, retrase la segunda dosis hasta que desaparezcan los síntomas. Consulte la página al dorso para obtener más información sobre CLENPIQ, la importancia de una dieta de líquidos transparentes y la hidratación.

INDICACIÓN

CLENPIQ es un medicamento recetado para adultos que sirve para limpiar el colon antes de una colonoscopia. CLENPIQ le induce diarrea para limpiar el colon. Limpiar el colon le permite a su médico ver el interior del colon con mayor claridad durante la colonoscopia.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- No tome CLENPIQ si su médico le ha informado que tiene problemas renales graves, un bloqueo en el intestino (obstrucción intestinal), un orificio en la pared del estómago o de los intestinos (perforación intestinal), gran dilatación de los intestinos (megacolon tóxico), problemas para evacuar los alimentos y los líquidos del estómago (retención gástrica) o alergia a alguno de los ingredientes de CLENPIQ.
- CLENPIQ y otras preparaciones intestinales pueden causar efectos secundarios graves, como pérdida grave de líquidos corporales (deshidratación) y cambios en las sales de la sangre (electrolitos). Estos cambios pueden causar alteraciones en los latidos cardíacos que pueden provocar la muerte, convulsiones (aunque nunca antes las haya tenido) o problemas renales. Sus probabilidades de sufrir una pérdida de líquidos y cambios en las sales de la sangre con CLENPIQ son mayores si tiene problemas cardíacos o renales, o si toma diuréticos o antiinflamatorios no esteroideos (AINE).

Consulte la Información de seguridad importante en el dorso.



CLENPIQ™

(sodium picosulfate, magnesium oxide,
and anhydrous citric acid) Oral Solution

10 mg/3.5 g/12 g per 160 mL bottle

PREPARADO, LISTO, COMPLETE LA PREPARACIÓN

¿Qué es CLENPIQ?

CLENPIQ es un medicamento recetado que limpia el colon.
CLENPIQ viene preparado para que lo tome directamente del frasco. No es necesario mezclarlo ni diluirlo.
No refrigere ni congele CLENPIQ.

¿Qué trae la caja de CLENPIQ?



Dos frascos de CLENPIQ
(de 5.4 oz cada uno)



Una taza de 8 oz para tomar
líquidos transparentes



La Guía del medicamento para el paciente y
las Instrucciones de uso para que consulte

Comience a hidratarse

El día antes de la colonoscopia, comience a hidratarse consumiendo solamente líquidos transparentes y deje de comer alimentos sólidos y lácteos.

Es importante hidratarse antes de tomar CLENPIQ, mientras toma CLENPIQ y después de terminar CLENPIQ. Siga todas las indicaciones de su médico.

LÍQUIDOS TRANSPARENTES PERMITIDOS PARA HIDRATARSE

Agua	Ginger ale y otros refrescos
Café o té solo	Jugos transparentes: como jugo de manzana o de uva blanca
Caldo o consomé transparente	Gelatina sin sabor
Bebidas deportivas	Barra helada de jugo



LOS LÍQUIDOS NO DEBEN SER ROJOS NI MORADOS. NO CONSUMA ALCOHOL, JUGO CON PULPA, LECHE, CREMA, LECHE DE SOJA O LECHE EN POLVO, NI OTROS LÍQUIDOS QUE NO SEAN TRANSPARENTES.

¿Preparado? ¿Listo? Este video puede ayudarlo a prepararse.

Mírelo acá www.CLENPIQ.com

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (CONTINUACIÓN)

- Es posible que su médico realice análisis de sangre después de que tome CLENPIQ para controlar la sangre y ver si hay cambios. Informe a su médico de inmediato si tiene alguno de estos síntomas como consecuencia de una gran pérdida de líquido corporal (deshidratación): vómitos, náuseas, hinchazón, mareos, cólicos en la zona del estómago (abdomen), orina menos frecuente de lo normal, problemas para tomar líquidos transparentes, problemas para tragar, convulsiones o problemas cardíacos.
 - CLENPIQ puede causar úlceras en los intestinos o problemas intestinales (colitis isquémica). Informe a su médico de inmediato si tiene dolor intenso en la zona del estómago (abdomen) o sangrado rectal.
 - Los efectos secundarios más frecuentes de CLENPIQ incluyen náuseas, dolor de cabeza y vómitos. Estos no son todos los efectos secundarios posibles de CLENPIQ. Consulte a su médico o farmacéutico para obtener más información.
- Le sugerimos informar los efectos secundarios negativos de los fármacos recetados a la Administración de Alimentos y Medicamentos (*Food and Drug Administration*, FDA). Visite www.fda.gov/medwatch, o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte la Información de prescripción completa adjunta, incluida la Guía del medicamento, disponible en www.CLENPIQ.com.